



## Ceporin 血樂平錠用藥指導(兒科)




114.11

初版

藥品成分名：Captopril 25mg/TAB

藥品作用方式：抗心衰竭劑、高血壓。

藥品如何服用：

步驟	工具	作法
泡製	 <p><input type="checkbox"/> 注射筒      <input type="checkbox"/> 塑膠小瓶      <input type="checkbox"/> 錠劑</p>	<p>以注射筒抽「<b>25 mL 冷開水</b>」加入塑膠小瓶中，然後放入「<b>一顆錠劑</b>」，震搖均勻。</p>
服藥	 <p>或</p> <p><input type="checkbox"/> 1 mL 注射筒      <input type="checkbox"/> 量杯</p>	<p>使用「<b>1 mL 注射筒</b>」或「<b>量杯</b>」，量取每次用量，由嘴角慢慢地滴入嘴中。</p>
儲存		<p>泡製後請<b>冷藏 (2-8°C)</b>，可以保存 28 天。</p>



東元醫療社團法人

**東元綜合醫院**

TON-YEN GENERAL HOSPITAL

### **忘記服藥怎麼辦：**

忘記服藥想起時儘快補服。若已經接近下次服藥時間，不需補服請跳過一次，下次服藥時依正常劑量服用，不能服用兩倍劑量。

### **服藥期間有哪些注意事項：**

1. 若泡成水劑請冷藏保存，保存期限 28 天。
2. 胃腸道內若有食物存在，會使吸收率減少，所以宜在餐前 1 小時或飯後兩小時服用。

### **可能的副作用及處理方式：**

昏厥，發燒、寒顫，胸痛，聲音嘶啞，呼吸或吞嚥困難，臉、口或四肢浮腫，胃痛，嚴重或持續性的噁心、嘔吐、腹瀉，眼睛或皮膚變黃，皮膚紅疹或癢等，如果產生嚴重不適，請立即告知藥師或醫師。

製作單位  
諮詢專線

藥劑部  
03-6207890