

## Nolvadex 諾瓦得士錠用藥指導

104.12

初版

110.12

第四版修訂

**藥品成分名：**Tamoxifen 10mg/F.C.T

**藥品作用方式：**Tamoxifen 是非類固醇的抗雌激素劑，可避免雌激素與雌激素受體結合，用於治療轉移性乳癌、乳癌手術後之輔助療法。

**藥品如何服用：**

按醫師指示服用，未經醫師指示不可自行調整用法用量。服用此藥應整粒吞服，不可嚼碎。

**忘記服藥怎麼辦：**

忘記服藥想起時應盡快補服。若已經接近下次服藥時間，不需補服請跳過一次，下次服藥時間依正常劑量服用，不能服用兩倍劑量。

**服藥期間有哪些注意事項：**

1. 有下列情形請務必告訴醫師：肝臟疾病、白內障、高血鈣、膽固醇過高、不正常的陰道出血或分泌物。
2. 有報告指出婦女服用此藥後，發生自發性流產、胎兒先天性缺陷，因此服藥期間要採取有效的避孕措施，直到治療完成後至少 2 個月。
3. 避免葡萄柚及葡萄柚汁。
4. 避免飲酒或含酒精成份的飲料。
5. 將藥物存放於密閉容器中，放置於室溫避光處，遠離濕氣與熱源。

**可能的副作用及處理方式：**

1. 如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：  
過敏反應，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難；尿液顏色變深或糞便轉白；胸痛或呼吸困難、咳血；發燒、冷顫、咳嗽、喉嚨痛、全身酸痛；大量或不正常的陰道出血；噁心、嘔吐、無食慾、胃痛；手、腳或單側身體感覺麻麻的；下肢疼痛；突發性或劇烈頭痛，視力、言語、行走發生問題；手、腳、足踝腫脹；不尋常的出血、挫傷或虛弱；皮膚或眼白變黃。



東元醫療社團法人

東元綜合醫院

TON-YEN GENERAL HOSPITAL

2. 如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

背部或關節疼痛、視力模糊、辨色能力改變；便秘、腹瀉、胃痛不適；頭痛；  
熱潮紅、陰道有異常分泌物；輕微紅疹；失眠。

製作單位  
諮詢專線

藥劑部  
03-6207890