

Fumide 福滿內服液劑用藥指導

114.07

初版

藥品成分名：Furosemide 10mg/ml,120ml/bot

藥品作用方式：

將體內過多的水分排出，減輕心臟的負擔。

藥品如何使用：

1. 請配合醫師及藥袋指示，每天固定時間給藥，不可自行停用或增加劑量。
2. 口服糖漿以 1 c.c 空針筒抽取正確劑量，由嘴角慢慢地滴入嘴中，避免與牛奶或其他食物併用。



正確抽取劑量方式：

橡皮頭**前端**對準刻度才可抽到正確劑量。

忘記用藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補服。但若已接近下次用藥時間，則不要補用，請跳過一次，下次用藥時依正常劑量使用，不要使用雙倍的劑量。

用藥期間有哪些注意事項：

1. 此藥品屬於利尿劑會使尿量增加，所以最好在早上或下午6點以前服用，以減少夜尿情形。
2. 使用本藥可能導致鉀離子流失，建議補充富含鉀的食物，例如：香蕉、奇異果、番茄、瘦肉、馬鈴薯、花椰菜、菠菜等。



東元醫療社團法人

東元綜合醫院

TOMYEN GENERAL HOSPITAL

- 依醫師指示攝取適當的水份，避免喝過多水會加重心臟的負擔，或是喝過少的水造成脫水。

可能的副作用及處理方式：

長期使用後由於尿液增多而干擾電解質及水分平衡，應注意是否有電解質不平衡的徵兆，如：食慾差、口乾、口渴、心跳過快、胃腸障礙（噁心、嘔吐、拉肚子）、躁動不安、眩暈、虛弱、倦怠、抽筋情形，若有發現應立即回診。

製作單位
諮詢專線

藥劑部
03-6207890