

GlucaGen 昇糖精用藥指導

114.08

初版

藥品成分名：Glucagon 1mg/vial


藥品作用方式：


促進肝臟釋放葡萄糖以提升血糖濃度，通常在幾分鐘內能有效升高血糖，用於治療由胰島素引起之嚴重低血糖。

嚴重低血糖症時，病人可能會昏迷，甚至抽搐(抽筋)，這時請馬上注射昇糖精於上臂或大腿肌肉內，並立即送醫和測量血糖。

藥品如何使用：

先準備藥品昇糖精、1片酒精棉片、注射空針1支

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將昇糖精乾粉(橘色蓋子)及注射水(白色蓋子)的瓶蓋打開 2. 用酒精棉片消毒昇糖精乾粉及注射用水的橡皮蓋
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 用注射空針抽取 1mL 的注射水，並注入昇糖精乾粉內
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 不要抽出注射針，輕輕搖晃玻璃瓶，直到昇糖精乾粉完全溶解
	<ol style="list-style-type: none"> 5. 抽出適量的藥水 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 成人或>25kg 或>8歲的小孩：使用 1mL ✓ <25公斤或<8歲的小孩：1/2mL



6. 注射在大腿外側肌肉或上臂肌肉內

服藥期間有哪些注意事項：

1. 讓失去知覺的人側臥，防止窒息或嘔吐導致吸入性肺炎。
2. 當病人恢復意識並能吞嚥時，給予高糖零食，如糖果、餅乾或果汁，高糖零食讓低血糖不會再次發生。
3. 病人若發生嚴重低血糖事件，在狀況穩定前，不可以駕駛或使用機械。
4. 藥品儲存於冰箱中(2°C 至 8°C)，不可冷凍，並存放在原來的包裝盒內避光。

可能的副作用及處理方式：

嚴重的不良反應是非常少見的，但噁心、嘔吐、腹痛偶爾會發生。

製作單位
諮詢專線

藥劑部
03-6207890