

Momenase 樂鼻寧水溶性鼻用噴液劑用藥指導


114.08

初版

藥品成分名：Mometasone furoate 50mcg/puff，140puffs/bot

藥品作用方式：過敏性鼻炎。

藥品如何使用：

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前應充分振搖容器。 2. 請將蓋子打開。
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 第一次使用時，以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身白色的頸部。一壓一放約 6-7 次，直到均勻的噴霧產生。
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 輕輕擤出鼻涕以清潔鼻孔。 5. 壓住一邊鼻孔。頭部微向前傾，小心將噴頭伸進鼻孔。
	<ol style="list-style-type: none"> 6. 以大拇指支撐瓶底，食指和中指壓住瓶身，一次壓到底是一個劑量，噴完後自此鼻孔輕輕吸氣。 7. 另一邊鼻孔重覆上述 4-6 動作。 8. 將蓋子蓋回。



忘記服藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補用。但若已接近下次用藥時間，則不要補用請跳過一次，下次用藥時依正常劑量使用，不要使用雙倍的劑量。

用藥期間有哪些注意事項：

1. 每瓶第一次使用前先按壓 6-7 次，直到均勻的噴霧產生。
2. 用藥完畢 15 分鐘內避免擤鼻子。
3. 每次使用後，用面紙擦拭噴頭，請勿用水清洗。
4. 如果認為噴嘴被堵塞，請勿使用別針穿刺噴頭。
5. 若超過 14 天以上沒有使用，使用前亦須重新引流，使用前先按壓兩下。
6. 儲存於 25°C 以下，遠離熱源。不可冷凍。

可能的副作用及處理方式

雖然副作用是不常見，但仍有可能會發生。

1. 如果以下副作用變嚴重或持續存在，請告知您的醫師：流鼻血、鼻腔刺激、頭痛、咽喉炎等。
2. 如果您有以下任何症狀，請立即告知醫師：皮膚發疹、搔癢等過敏現象。

製作單位
諮詢專線

藥劑部
03-6207890