

Nicotinell TTS 克菸貼片用藥指導

114.08

初版

藥品成分名：Nicotine 35mg/patch

藥品作用方式：

每天吸菸腦部會習慣平常尼古丁的濃度，當尼古丁濃度過低，滿足感會降低。戒菸時尼古丁濃度降低會導致心煩、心情悶、無聊、不安、注意力不集中、睡不好等問題。藉由此藥物給予低劑量的尼古丁，使您慢慢降低對尼古丁的依賴性。

藥品如何使用：

1. 去除外層包裝，取出貼片。
2. 將貼片具有黏性的內面，貼於清潔、乾燥、完整的皮膚(不能有乳液、酒精或軟膏的殘留物)，最好是在軀幹、上臂或臀部，並用手掌輕壓 10 秒鐘。
3. 使用 24 小時後，撕下對摺後丟棄。

用藥期間有哪些注意事項：

1. 使用貼片**治療期間必須完全停止吸菸**，以免造成尼古丁過量中毒。
2. 每天需更換黏貼部位，至少 5-7 天才能再貼同一處，避免皮膚炎產生。
3. 同一貼片請勿使用超過 24 小時。
4. 洗澡或洗手不必撕下，但不可用力擦洗貼片部位，避免脫落。
5. 若貼片不慎脫落，請更換新的貼片，並於原本更換時間撕下。
6. 尚未使用的貼片，請保存於鋁箔袋中，避免有效成分揮發。
7. 孕婦不宜使用。
8. 若貼片使用超過三個月仍無法戒菸，請停止使用，以免對尼古丁成癮。
9. 因戒菸貼片對熱敏感，請將儲存在 25°C 以下。本戒菸貼片若出現輕微的褪色情形，對貼片品質無影響，請安心使用。



東元醫療社團法人

東元綜合醫院

TON-YEN GENERAL HOSPITAL

可能的副作用及處理方式：

1. 首次使用貼片，若有輕微發癢、發熱或刺痛感，此為正常現象，約一小時後會緩解。撕下貼片的部位，可能會有輕微紅腫，一天內會慢慢消失。但若使用貼片出現嚴重發疹或紅腫，請立即撕下貼片，並告知醫(藥)師。
2. 使用貼片後出現心跳加快或嚴重心絞痛，請停止使用並告知醫(藥)師。

製作單位
諮詢專線

藥劑部
03-6207890