

## 麻醉性止痛藥用藥指導

104.12

初版

110.12

第四版修訂

### 本院口服麻醉性止痛藥：

藥品成分名	藥品商品名	藥品劑量
Tramadol	頓特痛	50 mg
Tramadol/Acetaminophen	服安痛	37.5/325 mg
Morphine sulfate	硫酸嗎啡錠	15 mg
Morphine SR	嗎啡長效膜衣錠	30 mg
Morphine MXL	默痛舒	60 mg
Codeine Phosphate	磷酸可待因	30 mg
Oxycodone CR	疼始康定	10mg
Hydromorphone PR	釋通緩釋	8mg

### 藥品作用方式：

1. Tramadol、Traceton 治療輕度至中度的疼痛。
2. Codeine 治療輕度至中度的疼痛及具有止咳作用。
3. Morphine、Oxycodone、Hydromorphone 治療中度至嚴重程度的疼痛。

### 藥品如何使用：

劑量依疼痛嚴重度、年齡與先前對止痛劑的需求量而定。請遵循醫師處方的劑量使用，沒有經醫師指示，不要自己更改劑量或停藥。

### 忘記服藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補吃。但若已接近下次服藥時間時，則不要補吃，只服用一次劑量即可，千萬不要服用雙倍的劑量。

### 用藥期間有哪些注意事項：

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 服用藥品期間，可能會有疲倦、體力衰退以及降低專注力，有開車及操作機械者請注意。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師，服用時應注意嬰兒或哺乳母親是否有呼吸急促、呼吸困難、改變姿勢時易頭暈眼花等症狀；如發現嬰兒有不正常的嗜睡、呼吸困難、無力等症狀，應儘速就醫。
4. 此類藥品不可以和酒精一起服用，會造成急性中毒。
5. 藥品請密封，放在陰涼處避免日光照射。
6. 勿將您的藥物提供給他人使用。

### 可能的副作用及處理方式：

吃藥後可能會產生一些副作用，但不是每個人都會發生。因此您使用若發生任何不適，請告知醫師或藥師。

1. 發汗、眩暈、頭痛、噁心、嘔吐、口乾、便秘、嗜睡、疲勞。
2. 心跳過慢、心悸、低血壓、暈厥。
3. 過度鎮靜、呼吸抑制、呼吸暫停、換氣不足。

### 未使用/過期藥品的處理：

任何未使用的止痛藥請帶回醫院歸還給藥師，藥物不可倒水槽處理，也不可丟家庭廢棄物處理。

製作單位  
諮詢專線

藥劑部  
03-6207890