

Xocova 用藥指導

114.08

初版

藥品成分名：


Ensitrelvir 125mg/TAB

藥品作用方式：

本藥為蛋白酶抑制劑，可抑制 SARS-CoV-2 病毒複製所需的主蛋白酶活性，阻斷病毒多蛋白前體的切割與成熟，進而抑制病毒增殖。適用於感染 COVID-19 病毒者，症狀出現 3 天內之成人與 12 歲以上兒童。

藥品如何服用：

每天服用一次，連續使用五天，一定要按時服用，不可任意停藥，飯前或飯後服用都可以。



管灌病人服用方式：

1. 第一天取出三顆 Xocova 磨粉，第二至五天每天取出一顆 Xocova 磨粉。
2. 吸取 10mL 水與藥粉混合後，立即給藥。
3. 再以 10-30mL 溫開水搖晃針筒，沖洗鼻胃管路。

忘記服藥怎麼辦：

1. 忘記吃藥未超過 12 小時，馬上補吃一次，並於下次吃藥時間正常服用。
2. 忘記吃藥超過 12 小時，跳過該次，並於下次吃藥時間正常服用。
3. 請勿一次服用兩倍劑量。

服藥期間有哪些注意事項：

若您正在服用秋水仙鹼(Colchicine)且腎功能或肝功能不全者，請告知醫師，請勿投與本藥，因為會增加血中秋水仙鹼的濃度。



東元醫療社團法人

東元綜合醫院

TON-YEN GENERAL HOSPITAL

可能的副作用及處理方式：

紅疹、瘙癢等過敏反應，噁心、嘔吐、腹瀉、腹部不適等消化系統不適，也可能導致其他副作用包含、HDL 膽固醇下降、三酸甘油酯上升、膽紅素上升、血中膽固醇下降及血脂異常等，如果您產生嚴重不適，請立即告知藥師或醫師。

製作單位
諮詢專線

藥劑部
03-6207890